



Plantana

květen 2025

Info 5

novinky dvouletek

Statistiky prodeje bylinek

Choroby rajčat a paprik

Nové trio letáky



NOVINKY DVOULETEK

Jako každý rok jsme si pro vás přichystali mnoho zajímavých novinek v sortimentu dvouletek. Nejdůležitější je bezesporu zcela nová série violek Penny Pro, která se vyznačuje vyrovnaným kvetením i vzrůstem mezi jednotlivými barvami. Díky tomu se dá velmi snadno termínovat a expedovat ve všech barvách současně. Vylepšená série nejprodávanějších macešek Delta Pro, uvedená na trh vloni, se dále rozrůstá, nyní už můžete vybírat z 25 barev a směsí. Novinky máme i v nabídce primulí okoličnatých, jejichž obliba stále roste.

Viola cornuta PENNY PRO

Penny Pro nastavuje nový standard trhu. Viola určená zejména do květináče K9, je vhodná pro prodej na podzim i na jaře. Je velmi uniformní mezi jednotlivými barvami, všechny variety nakvetou během pouhých tří dní. Série hned při uvedení na trh obsahuje 13 atraktivních barev, včetně velmi oblíbených dvoubarevných. Penny Pro Orange je první violka se sytě oranžovým květem a současně s kompaktním habitem.



Viola wittrockiana DELTA PRO

Nová generace Delta Pro se vyznačuje raným kvetením na krátké květní stopce, všechny variety jsou mezi sebou velmi vyrovnané v habitu i kvetení. Proto je nejprodávanější maceškou v České republice i na celém světě. Můžete pěstovat na podzimní i jarní prodej v květináči K9 anebo v desetipacku. Pro příští rok přidáváme vylepšenou červenou Clear Red.



Primula elatior SPRING BLISS

Nová série primulí s drobnými, pěkně zbarvenými, otevřenými květy. Série obsahuje 3 zajímavé barvy, doporučujeme pěstovat v květináči K10,5 až K11, nakvétá od února.



Primula elatior STIELETTO

Velmi oblíbená prémiová primule, která se pěstuje většinou v květináči K10,5 až K11 (doporučujeme použít naše nové potištěné květináče GardenStar pro prémiovější vzhled). Zdaleka nejprodávanější je Sunset Orange, která má velmi silnou květní stopku a obrovské sytě žluté květenství. Série ale obsahuje celkem 9 barev a mix (na fotce je atraktivní Red Flame)



STATISTIKA PRODEJE BYLINEK

Prodej bylinek dlouhodobě roste, čemuž napomáhá zájem spotřebitelů o zdravý životní styl a také o využití vlastních výpěstků v kuchyni. Bylinky se dají využívat k různým účelům, a proto je v našem konceptu „Bylinky a koření“ třídíme do skupin dle použití. Připravili jsme pro vás přehled těch nejprodávanějších druhů a odrůd, již tradičně také průměrné maloobchodní ceny oblíbených položek. To vše jako inspiraci pro vaše příští objednávky.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ DRUHY

Nejprodávanější bylinkou je u nás petržel (přibližně napůl kadeřavá a hladká), dále rod Thymus, obsahující tymián a mateřídoušku, následovaný bazalkou, mátou a rozmarýnou. Celkově je trend prodeje bylinek ve větším květináči pro dlouhodobé pěstování.

1. Moroccan
2. Kentucky Colonel
3. Spanish
4. Strawberry
5. Cubanito
6. Citrata Lime
7. Pineapple
8. Upright
9. Piperita
10. Hillary Sweet Lemon



NEJPRODÁVANĚJŠÍ BAZALKY

Nejprodávanější bazalkou je klasická a intenzivně vonící Sweet. Do popředí zájmu se dostávají také D-Fencesil odolnější k padlí a Coldasil odolnější k nízkým teplotám. Vzrůstající zájem je také o roubovanou bazalku na kmínku, kterou může spotřebitel sklízet dlouhodobě nůžkami po obvodu.

1. Faustinoi
2. Creeping Red
3. Compactus
4. Pink Chintz
5. Snowdrift
6. Citriodorus
7. Wooly
8. Doone Valley
9. Vulgaris
10. Variegated



1. Petržel
2. Tymián a mateřídouška (Thymus)
3. Bazalka
4. Majoránka
5. Máta
6. Rozmarýna
7. Pažitka
8. Kopr
9. Šalvěj
10. Oregáno



NEJPRODÁVANĚJŠÍ ODRŮDY MÁTY

Ze široké nabídky různě aromatických mát vede odrůda Moroccan vhodná nejen do Mojita, ale i do lahodného čaje. Na paty ji ale už šlape nová Kentucky Colonel, která velmi dobře rozvětvuje. Následuje je máta Spanish, Strawberry a Cubanito.

1. Sweet
2. D-Fencesil
3. Coldasil
4. Bazalka na kmínku
5. Herbalea Ajaka





NEJPRODÁVANĚJŠÍ THYMUS

Přesná hranice mezi tymiánem a mateřídouškou je těžké určit, proto zařazujeme rod Thymus jako jednu skupinu. Na prvním místě se umísťuje tymián Faustinoi, následovaný mateřídouškou Creeping Red a tymiánem Compactus.




NEJOBLÍBENĚJŠÍ DODACÍ TÝDNY

Vrchol jarní hrnkovací sezony je mezi týdny 9 a 15, následovaný doobjednávkami na pozdnější prodej. Do oblíby se stále více dostává týden 35, určený k napěstování kvalitních rostlin ve studeném skleníku na brzký jarní prodej.



MALOOBCHODNÍ CENA MÁTY

Průměrná maloobchodní cena máty v květináči K10,5 je 40,33 Kč (včetně DPH). Rozptyl cen u patnácti českých pěstitelů je od 29 do 49 Kč, nejčastější cena je 35 a 49 Kč za rostlinu.



MALOOBCHODNÍ CENA MAJORÁNKY

Průměrná maloobchodní cena majoránky v květináči K9 je 35,00 Kč (včetně DPH). Rozptyl cen u patnácti českých pěstitelů je od 29 do 45 Kč, nejčastější cena je 35 Kč za rostlinu.

CHOROBY A ŠKŮDCI RAJČAT A PAPRIK

PLÍSEŇ BRAMBOROVÁ

Popis: tato houbovka se objevuje koncem léta, způsobuje vznik skvrn na rajčatových listech, nekrózu plodů a celkové odumírání rostlin. Během krátké doby tak může úplně zničit celou úrodu.

Symptomy: velké neohraničené šedozelené skvrny, zpočátku vodnaté, černě žilkované, objevují se hlavně na okrajích listových čepelí, rychle se šíří na celý povrch listů, získávají tmavě hnědou barvu a úplně zasychají. Na nezralých plodech se objevují nepravidelné skvrny zelenohnědé barvy, které se rychle rozšiřují a později tmavnou do sytě hnědé.

Prevence: pěstujete-li rajčata ve skleníku, pokuste se udržet rostliny spíše sušší, zálivku směřujte pouze ke kořenům, a zároveň je dobré předejít orosení přitápěním a větráním.

Ochrana: AZBANY; AZOLINE; AZYL; ORTIVA; (Azoxystrobin); CASINO ROYALE (Boskalid, Pyraklostrobin); CUPROXAT SC; KOCIDE 2000; KUPRIKOL 50; CHAMPION 50 WG (sloučeniny Cu); ACROBAT MZ; INFINITO (Fluopicolide, propamocarb-hydrochloride); SCAB 480 SC (Captan).
Biologická ochrana: Trichoderma spp., Penicilium, nebo Pythium oligandrum. Lze využít i bakterie rodu Bacillus spp., Streptomyces spp. nebo Pseudomonas spp.



ALTERNARIOVÁ SKVRNITOST



Popis: je podobná na plíseň bramborovou, ale napadá rostliny už od poloviny léta. Ačkoliv může výrazně poškodit plody, na rozdíl od rajčatové plísně nebývá pro rostliny fatální.

Symptomy: na starších listech poměrně velké, nepravidelné, tmavohnědé, výrazně ohraničené skvrny s typickým koncentrickým vrstvením. Na stoncích jsou propadlé skvrny častou příčinou jejich lámání a na květních stopkách opadu květů a mladých plůdků. Na plodech vznikají velké, tmavé, vpadlé skvrny, nejčastěji ve stopkové části, za vlhka se skvrny pokrývají černým, sametovým povlakem.

Prevence: nepěstovat rajčata opakovaně na stejném stanovišti, dodržovat odstup od záhonů s bramborami, slunečné a vzdušné stanoviště.

Ochrana: je třeba většinou již v době výskytu prvních příznaků napadení. CASINO ROYALE (Boskalid, Pyraklostrobin); KUPRIKOL 50; CHAMPION 50 WP; CUPROZIN PROGRESS (Hydroxid měďnatý); DAGONIS (Difenokonazol, Fluxapyroxad); ORTIVA (Azoxystrobin); ZATO 50 WG (trifloxystrobin); REVUS (Mandipropamid).

ANTRAKNÓZA

Popis: rozšiřuje se větrem a deštěm, plody kontaktem s půdou nebo jiným napadeným plodem, zdrojem může být i osivo.

Symptomy: na dozrávajících a zralých plodech se objevují propadlé, kulaté, postupně se zvětšující skvrny, s patrnými koncentrickými zónami. Zpočátku jsou skvrny béžové až hnědé, později tmavnou.

Prevence: mulčování nebo nastýlání, výsadba rostlin k opoře, častá sklizeň

Ochrana: biologická POLYVERSUM (Pythium oligandrum M1); Bacillus spp. Tyto se aplikují zpravidla preventivně před výsadbou sazenic nebo v době výskytu prvních příznaků.



Tento článek obsahuje jen nejčastější choroby a škůdce, pro více informací kontaktujte naše zástupce - vždy vám pomohou s určením problému i řešením. Doporučená ochrana vychází z našich zkušeností, přípravky vždy nejdříve otestujte na menším počtu rostlin.

ČERNĚ RAJČATOVÁ

Popis: dokáže přezimovat výtrusy na rostlinných zbytcích, konstrukci skleníků a fóliovníků, případně i na nářadí. Šíří se při vzdušné vlhkosti vyšší než 80 % a teplotě přesahující 20 °C. Rozvoji choroby pomáhá i kondenzace vody na listech.

Symptomy: na vrchní straně listů se objevují světlezelené až žluté difúzní skvrny, na jejichž spodní straně vyrůstá jemně sametový povlak který je z počátku nazelenalý, později olivově hnědý. Skvrny se rychle zvětšují, listy hnědnou a odumírají. Choroba se šíří od spodních listů směrem nahoru.

Prevence: používání odolných odrůd, dostatečné větrání celého prostoru, dezinfekce nářadí, zalévání rostlin takovým způsobem, aby na listech dlouho nezůstávala voda

Ochrana: je možné použít přípravky, které jsou určeny i proti plísni bramborové na rajčatech, alternariové skvrnitosti nebo septoriové skvrnitosti. DAGONIS (Difenokonazol, Fluxapyroxad); CHAMPION 50 WP; KUPRIKOL 50 (sloučeniny Cu); ORTIVA (Azoxystrobin); ZATO 50 WG (trifloxystrobin).



SEPTORIOVÁ SKVRNITOST

Popis: přezimuje na napadených částech rostlin, i na některých plevelných rostlinách. Za vegetace se šíří deštěm a větrem. Chorobu podporuje chladnější a sušší počasí, avšak k jejímu šíření je potřebná dostatečná občasná vysoká vlhkost a vysoká teplota vzduchu.

Symptomy: na starších listech způsobuje drobné, kulaté, tmavé skvrny s černě zbarvenými drobnými plodničkami uprostřed. Skvrny postupně splývají, listy zasychají a opadávají. Jsou napadány květní stopky a někdy i stonky, plody zůstávají zdravé. Při časném napadení odumírají celé rostliny.

Ochrana: CUPROZIN PROGRESS; CHAMPION 50 WP; KUPRIKOL 50 (sloučeniny Cu).
Biologická ochrana: účinky antagonistických mikroorganismů na bázi hub jako je rod Trichoderma spp., Pythium oligandrum. Lze využít i bakterie rodu Bacillus spp., Pseudomonas spp.



PADLÍ

Popis: šíří se vzduchem, optimálními podmínkami pro výskyt a šíření jsou střídavá vlhkost vzduchu (spíše sušší) a vyšší teploty (20 až 25 °C).

Symptomy: na listových čepelích (převážně na lícni straně), ale i na řapících a lodyhách vznikají bílé moučnaté skvrny, které se zvětšují, až vytvářejí souvislé povlaky. Napadené části pomaleji rostou, žloutnou a usychají.

Ochrana: ORTIVA (Azoxystrobin); ORONDIS EVO (Azoxystrobin, Oxathiapiprolin); LUNA SENSATION (Fluopyram, Trifloxystrobin); KUMULUS WG (Síra); DAGONIS (Difenokonazol, Fluxapyroxad); KUMULUS WG (síra); ORTIVA (azoxystrobin); TALENT (myklobutanil); ZATO 50 WG (trifloxystrobin).
Biologická ochrana: AMYLO-X WG (Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum); TAEGRO; POLYVERSUM (Pythium oligandrum M1).



BAKTERIÁLNÍ VADNUTÍ

Popis: šíření podporuje vysoká vlhkost vzduchu (přes 80 %) a teplota kolem 20–25 °C. Na větší vzdálenosti se šíří semeny nebo sazenicemi.

Symptomy: nejdříve vadnou jednotlivé lístky, poté se zkrucují, usychají a hnědnou. Následuje vadnutí a usychání celých listů, lodyhy a nakonec celé rostliny. Při odtržení řapíku od stonku je dobře viditelné zežloutnutí až zhnědnutí svazků cévních. Infikované mladé nezralé plody jsou zakrnělé a deformované.

Ochrana: ALIETTE 80 WG (Fosetyl-AI); FLOWBRIX (Oxichlorid měďnatý).



STOLBUR

Popis: napadá rostliny čeledi lilkovitých, přenašeči stolburu jsou některé druhy křísů

Symptomy: na rajčeti dochází k zkracování internodií a redukci všech orgánů, je potlačený růst vegetačního vrcholu, projevuje se zvýšené vyrůstání výhonků v úžlabí listů, čímž vzniká metlovitost. Na paprice se první symptomy ukazují na vrcholku rostliny, listy se stácejí, okraje nabývají chlorotického zbarvení, mezi nervy se tvoří nažloutlé skvrny. Chloróza se rozšiřuje po celé rostlině a rostlina nabývá vzpřímeného keřovitého tvaru.

Prevence: hubit svačec rolní jako hlavní rezervoárovou rostlinu, likvidace posklizňových zbytků, hubení křísů insekticidy.



BAKTERIÁLNÍ SKVRNITOST

Popis: nejčastější bakteriální choroba rajčat a paprik, k výskytu dochází po deštivém a větrném počasí a při vyšší teplotě vzduchu

Symptomy: na listech se vytvářejí přibližně 3 mm veliké, fialově šedé skvrny s černým středem a žlutým lemem. Při silném napadení jsou listy roztřepené a často opadávají. Na ještě zelených plodech nejprve vodnaté, mírně vyvýšené, 3–6 mm velké skvrny se žlutým lemem. Později skvrny zčernají a jejich žlutý lem se ztratí.

Ochrana: ALIETTE 80 WG (Fosetyl-AI); FLOWBRIX; CUPROZIN PROGRESS; DEFENDER; FUNGURAN PROGRESS (sloučeniny Cu)



TOBAMOVIRY

Symptomy: deformace listů, pruhovitost listů, stonků i plodů, přítomnost listové mozaiky, ale také hnědnutí dužniny plodů.

Prevence: likvidace rostlin s jakýmkoliv příznaky, omezit výskyt přenašečů, likvidace plevelů, dodržení izolační vzdálenosti mezi rostlinami, použití rezistentních odrůd



VIROVÁ BRONZOVITOST RAJČETE

Symptomy: přenáší se hlavně prostřednictvím třásněnky západní, podléhá přísným karanténním opatřením. Nekrotické a chlorotické léze, kresby a kroužky na listech, často soustředné, nekrózy stonků, bronzovitost stonků a listů, deformace listů a stonků, nekrózy růstových vrcholů, nepravidelné dozrávání plodů, na vybarvených plodech

Prevence: likvidace rostlin s jakýmkoliv příznaky, omezit výskyt přenašečů, likvidace plevelů, dodržení izolační vzdálenosti mezi rostlinami, použití rezistentních odrůd.



ÚŽEH PLODŮ RAJČETE

Symptomy: světlejší zbarvení povrchových pletiv (slupky) plodů, propadliny, postupně nekróza pletiv.



NEKRÓZA VRCHOLU PLODŮ

Symptomy: na konci plodů se vytvoří vpadlá a ohraničená skvrna, která je nejprve vodnatá, později tmavá až černá.

Prevence: pravidelná a dostatečná zálaha (kořenová soustava nesmí vyschnout), hnojení vápníkem

Ochrana: při prvních příznacích důkladně rostliny postříkat 0,5 % chloridem vápenatým nebo 1,5 % Kalkosanem, nejpozději 14 dnů před sklizní



SVINUTKA LISTŮ RAJČETE

Popis: vyskytuje se často při pěstování rajčat v půdách s vyšší salinitou. Ke kroucení listů může dojít také kvůli nedostatku některých stopových prvků v půdě vašich rajčat.

Symptomy: Bór: mladé listy se rolují. Měď: listy mají tmavé skvrny a špičky se stáčí. Vápník: listy se špatně vyvíjí a deformují se. Zinek: zkracuje se rozteč výhonků a listy jsou menší a vlní se. Naopak přemíra manganu může způsobit kroucení listů a zasychání

Prevence: základní ochranou je pravidelná a přiměřená zálaha s kompletním přihnojením



RŮSTOVÉ PRASKLINY PLODŮ RAJČETE

Popis: příčinou je změna v rychlosti růstu pletiv způsobená vysokými srážkami po období sucha.

Symptomy: příčné, kruhové i podélné praskání exokarpu a mezokarpu plodu.

Prevence: pravidelná a dostatečná zálaha, pěstování odolných odrůd

MAKADLOVKA A VRTALKY

Symptomy: na listech jsou přítomny charakteristické miny. Miny makadlovky jsou nepravidelné, širší a plošší na rozdíl od min způsobených vrtalkami rodu *Liriomyza*, které jsou užší, různě klikaté a překřížené.

Ochrana: ochrana proti housenkám je založena na aplikaci přípravků na bázi účinných látek VOLIAM TARGO; CORAGEN 20 SC (abamectin, chlorantraniliprole); indoxacarb; SPINTOR (spinosad); teflubenzuron a thiacloprid a proti dospělcům na bázi účinných látek MOSPILAN 20 SP, CAREO (acetamiprid); BELEM 0,8 MG, VAZTAK ACTIVE (cypermethrin); DECIS FORTE, SIVANTO ENERGY (deltamethrin); imidacloprid a teflubenzuron. Biologická ochrana: dostupné selektivní biologické insekticidy Lepinox plus (*Bacillus thuringiensis* var. kurstaki) a NeemAzal T/S (azadirachtin), účinné na housenky a vhodné i do ekologického zemědělství.



TŘÁSNĚNKY

Popis: poškozuji rostliny sáním na vzrostných vrcholech, květech a listech. Posátá pletiva se deformují a mění zbarvení, květy a mladé plody opadávají. Významní přenašeči virů.

Signalizace: pomocí modrých lepových desek.

Ochrana: APIS 200 SE, BENEVIA, DELMETROS 100 SC, KORON 100 SC, SPINTOR, VERTIMEC 1.8 EC. Mezi přirozené nepřátele patří draví roztoči čeledi Phytoseidae, např. *Amblyseius swirskii* a *Neoseiulus cucumeris*, dále pavouci a dravé ploštice *Orius insidiosus*.

MŠICE

Popis: jsou velmi odolné proti vysokým teplotám a ve skleníku a fóliovníku představují větší nebezpečí než venku, kde mají řadu přirozených nepřátel (sluněčka, zlatoočka, pestřenky, dravé ploštice).

Symptomy: listy se svažují a zvlní, až nakonec zežloutnou. Mšice postupně napadají i stonky, mladé výhonky a květy, které deformují. Na výměšcích mšic se uchycují černě. Mšice jsou přenašečem virů.

Signalizace: pomocí žlutých lepových desek

Ochrana: KARATE ZEON 5 CS, DURS BAN 480 EC, jejich výskyt snižují například i přírodní KARANIMBA MIKRO, ROCK EFFECT, NEEMAZAAL TS

SVILUŠKY

Popis: teplomilný roztoč, škodící hlavně v letních měsících. Roztoči sají na spodní straně listů, způsobují jejich odumírání a opadávání a nakonec celé rostliny odumírají. Listy mezi žilkami žloutnou a jejich spodní části hnědnou a sesychají. Při silném výskytu jsou přítomny i drobné pavučinky.

Ochrana: ERADICOAT MAX, FLORAMITE 240 SC, KANEMITE 15 SC, MILBEKNOCK, NISSORUN 10 WP, NISSORUN 25 SC, ORTUS 5 SC, SHIRUDO, VERTIMEC 1.8 EC, VOLIAM TARGO.

Biologická ochrana: TYPHLODROMUS PYRI (dravý roztoč), sviluška ovocná - SPIDEX (*Phytoseiulus persimilis*)

MOLICE

Popis: všechny generace škodí sáním na spodní straně listů a vylučováním medovice. Při silném napadení rostliny zpomalují svůj růst, snižuje se úroda. Za vhodných podmínek ve skleníku a v pokojových podmínkách probíhá vývoj nepřetržitě. Přenašeči virů.

Signalizace: pomocí žlutých lepových desek.

Ochrana: APIS 200 SE, BENEVIA, KARATE ZEON 5 CS, KORON 100 SC, MOSPILAN 20 SP, SHERPA 100 EW. Biologická ochrana: ENCARSIA FORMOSA (parazitická vosička). Proti molicím dobře fungují přípravky na bázi olejů a silic, například BIOOL, KARANIMBA MIKRO, FLORA VITA CITRO, ale i přírodní insekticid NEEMAZAAL TS

NOVINKY V MARKETINGU

Stále přemýšlíme, jak Vám ještě více pomoci s prodejem, proto přicházíme s dalším a dalším propagačním materiálem. Rozhodli jsem se místo našeho jarního spotřebitelského časopisu Gardenstar vydávat trioletáky ke všem důležitým skupinám rostlin - jsou lépe zacílené na konkrétní plodiny a dají se používat dlouhodobě. Připravili jsme i nové banery, speciální akci na potištěné květináče a nezapomněli jsme ani na naše nejmenší zahradníky.

TRIO LETÁKY BYLINKY

Na podporu prodeje bylinek jsme vytvořili 3 verze trio letáků rozdělených podle nejčastějších druhů použití - vybrat si můžete trio letáků Bylinky na maso, Bylinky na salát a pomazánku nebo Bylinky na čaj a koktejly. V každém letáku spotřebitel najde šest nejdůležitějších bylinek s delším popisem a obrázkem, dalších 8-10 bylinek potom s krátkým popisem. Letáky by měly zvýšit zájem spotřebitelů o nákup většího počtu bylinek.

Cena jednoho letáku je 1,20 Kč, dodáváme je ve svazcích po 100 kusech.



TRIO LETÁK BALKONOVÉ OVOCE

Balkonové ovoce je u nás stále oblíbenější, přesto je velká skupina spotřebitelů, kteří neví, že si mohou na balkoně nebo na terase vypěstovat vlastní maliny, borůvky nebo jahody. Na tyto zákazníky cílí náš další trio leták, který obsahuje všechny odrůdy určené pro pěstování v nádobách (nebo na malých zahradách). Motivujte své zákazníky k nákupu nejen jahod, ale i dalšího balkonového ovoce. Cena jednoho letáku je 1,20 Kč, dodáváme je ve svazcích po 100 kusech.



STOJAN NA TRIO LETÁKY

Mějte všechny trio letáky na prodejním pultě uspořádané přehledně a k dispozici všem důležitým zákazníkům. Stojany na tři druhy trio letáků jsou vyrobeny z průhledného plastu, proto vypadají moderně a vzdušně. Dají se jednoduše přenášet a seskupovat vedle sebe. Na zadní straně mají otvory pro případné pověšení na zeď. Plánujeme tisknout další druhy trioletáků, abyste mohli vždy něco aktuálního do stojanu umístit.

Cena jednoho stojanu o velikosti 26x11,5x11,5 cm je 120 Kč bez DPH.





BANERY

Do naší nabídky plastových odolných banerů přibývají stále nové položky, nyní máte na výběr už z 30 různých druhů. Ve velikosti 54x170 cm (na boční stranu CC vozíku nebo na stěnu) nově přibýly další dva. První podporuje prodej stále oblíbenější petunie s malým květem Itsy, která je velmi odolná k nepřízní počasí. Druhý baner propaguje bramboříky, které už snad definitivně ztratily pověst staromódní květiny, která dlouho nevydrží v interiéru. Každý z banerů si můžete objednat za 250 Kč, odběratelům většího počtu rostlin nabízíme jeden kus zdarma.

OMALOVÁNKY

Nezapomínáme ani na Vaše nejmladší zákazníky (naši budoucnost). K již vydávaným třem dílům Zápisníků mladého zahradníka a knize Pohádky o zahradě nabízíme nově i Omalovánky pro mladé zahradníky s myškou Pampeliškou. Děti v nich najdou 16 stran obrázků vycházejících z naší pohádkové knihy. Velkoobchodní cena je 9,90 Kč (na omalovánky je nulová DPH).



AKCE KVĚTINÁČ ZA KORUNU

Připravili jsme pro Vás oblíbenou akci potištěný květináč za korunu. Za každý sadbovač dvouletek nebo jarních trvalek objednaný do konce června si od nás můžete koupit 30 potištěných květináčů Gardenstar o velikosti K11 v ceně 1 Kč bez DPH (jeden karton obsahuje 2.212 kusů, za zbývající počet Vám bude účtována běžná cena 2,10 Kč za kus).

Tyto květináče doporučujeme použít například na prémiové primule (Gessi, Tiara, Trento, Prominent), polopřevísle macešky (Endurio) nebo jarní trvalky (Aubrieta, Phlox subulata, Saxifraga, Aquilegia a mnoho dalších).

Díky prodeji v potištěném květináči budou Vaše rostliny vypadat prémiověji, prodají se proto rychleji a za vyšší cenu.

Pro více informací prosím kontaktujte našeho zástupce.



FOTOGRAFIE OD NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Naši zástupci Vás navštěvují každý den, aby Vám poradili nejen s výběrem vhodných odrůd, ale i s pěstováním a prodejem Vašich rostlin. Během svých návštěv pořizují fotografie, které by mohly inspirovat ostatní pěstitele. Zde přinášíme výběr těch nejzajímavějších z minulého období.



muškát růžičkový Rosebud
Astrid před expedicí



přezimovaná máta je už
v dubnu ve vysoké kvalitě



přezimovaný angrešt
s velkou etiketou



přezimovaná gazanie v dubnu



pivoňky z letošních kořenů,
fotka ze 17. týdne



kvalita bazalky z Izraele



přezimované trávy
v dubnu



bazalka na
kmínku je koncem
dubna připravena
k prodeji

Je nejvyšší čas objednat tyto rostliny:



Dvouletky, hlavně
macešky a primule



Jarní trvalky na
podzimní hrnkování



Polohotové mandevilly
na jaro 2026



Drobné ovoce na
přezimování



Okrasné trávy na
přezimování



Čemeřice na jarní
hrnkování 2026

Pro více informací kontaktujte našeho zástupce



Tomáš Kulhánek
Manažer prodeje
tel: 724 341 315



Ladka Rubínová
Východní a Střední Čechy
tel: 724 549 309



Štěpán Zima
Západní a Jižní Čechy
tel: 725 338 279



Jana Schubertová
Morava a Vysočina
tel: 793 912 626

www.plantana.cz