



Plantana

červenec 2025

Info 6

Novinky letniček a zeleniny 2026

Pěstování a choroby chryzantém

Statistiky prodeje trvalek

Bonus program 2026



NOVINKY LETNIČEK 2026

Jako každý rok jsme pro vás připravili pestrou nabídku novinek v sortimentu letniček – jak ze semen, tak i z řízků. Všechny je najdete v našem novém katalogu, který jste od nás obdrželi. Zde vám přinášíme výběr jen těch nejdůležitějších odrůd, doplněný o podrobnější informace. Novinky jsme seřadili podle jejich významu – tradičně mezi nejoblíbenější druhy patří petúnie a muškáty, které si svou popularitu udržují i letos.

Petunia hybrida GARDEN SUPREME

Garden Supreme je úplně nový typ řízkované balkonové petunie - na rozdíl od Sanguny má mnohem větší převis, na rozdíl od Surfinie nakvétá po celé rostlině. V nabídce jsou pro tuto sezonu čtyři pěkné barvy červených a růžových odstínů. Doporučujeme pěstovat ve větším květináči anebo přímo v závěsu, rostlina je bujná hned od začátku - je vhodné ji 2x zaštipnout. Spotřebitel bude nadšený ze záplavy květů a velkého převisu, samozřejmě je důležité rostlinu pravidelně hnojit.



Petunia hybrida SANGUNA DEEP YELLOW DEKKO DEEP YELLOW

V nejprodávanější sérii petunií Sanguna i v drobnokvěté sérii Dekko přidáváme jako novinku tmavě žluté variety Deep Yellow. Konečně tak bude na trhu tmavě žlutá barva petunií s pěkným habitem. Protože jde o úplnou novinku, matečnice je pro rok 2026 velmi omezeně dostupná - doporučujeme objednávat co nejdříve, než bude vyprodaná.



Pelargonium interspecific CALLIOPE WHITE SPLASH & ROSE SPLASH

V nejkvalitnější sérii hybridních muškátů Calliope přidáváme do nabídky velmi žádané dvoubarevné variety White Splash a Rose Splash. Kromě atraktivního květu se samozřejmě vyznačují vlastností všech Calliope - bohatým kvetením po celou sezonu bez přestávek.

Scaevola aemula FANATIX

Přinášíme novinku i do sortimentu vějířovky. Nová série Fanatix obsahuje kompaktnější i převislejší odrůdy - vždy ale bohatěji kvetou než starší odrůdy. Nabízíme kompaktní typ v modré, převislé variety jsou pak k dispozici ve třech různých barvách - dají se velmi dobře kombinovat mezi sebou, jak vidíte na obrázku.



Impatiens interspecific SPECTRA

Na rozdíl od tradičního Impatiens Nová Guinea je hybridní série Spectra velmi odolná k přímému slunci, má větší květy a lépe rozvětluje. Můžete pěstovat v květináčích od 10,5 po 13 cm, rostlina se velikostně přizpůsobí. Pro příští sezonu můžete vybírat z deseti atraktivních barev.



Tagetes patula nana ALUMIA

Nová série nízkých a raných afrikánů Alumia je vhodná do packu i menšího květináče (9-10 cm). Má jednoduché květy větší velikosti, pro příští sezonu je připraveno osm atraktivních barev.



Rudbeckia hirta MAYA - SUMMER SPIRIT - AMARILLO

V neposlední řadě rozšiřujeme i nabídku letničkových rudbeckií o tři zajímavé variety. Můžete si vybrat plnokvětou Mayu (květ o průměru 10 cm), barevně velmi zajímavý Summer Spirit nebo kompaktní a velkokvětý Amarillo. Doporučujeme pěstovat ve větším květináči (13-17 cm).



NOVINKY ZELENINY 2026

Připravili jsme pro Vás také mnoho novinek v sortimentu stále žádanější zeleniny. Koneční spotřebitelé si rádi vypěstují vlastní čerstvou a zdravou zeleninu. A netýká se to už jen starší generace zkušených zahrádkářů, ale i mladých pěstitelů v městských bytech - proto máme v nabídce i širokou škálu balkonových odrůd. Všechny odrůdy najdete v našem novém katalogu.

SEMENÁČOVÁ ZELENINA

V semenáčové zelenině jsme vyslyšeli poptávku zákazníků po ještě širší nabídce mladé sadby odrůd firmy Semo. Sazenice napěstované ve středomoří jsou totiž dobře vyvinuté, velmi vyrovnané a nevytahují se tolik jako ty z vlastního výsevu.

Rajčata koktejlová JAHODO - BEJBINO - DATLO

V sortimentu oblíbených koktejlových rajčat jsme přidali hned tři zajímavé odrůdy. Jahodo má krásně tvarovaný plod sladké chuti. Bejbino je klasické bohatě plodící kulaté rajčátko. Datlo je chutné datlovitě rajče oranžově žluté barvy.



Papriky ORENY - RADUZA - OSTRY

Doplnili jsme i naši nabídku paprik vhodných do našich podmínek. Oreny je sladká kvadratická paprika oranžové barvy. Raduza je oblíbená kapie typu Pirouet, vhodná k přímé konzumaci, ale také například k plnění - stejně jako mírně pálivá Ostry. Všechny tři odrůdy se dají sklízet ve stadiu zeleného plodu i plně vybarvené.



Roubovaná zelenina

V novinkách roubované zeleniny jsou zastoupeny všechny důležité druhy. Jako první v ČR nabízíme roubovaný vodní meloun bez semen – chuťově velmi atraktivní odrůdu, u níž očekáváme zvýšený zájem ze strany zákazníků. Doporučujeme objednávat co nejdříve, už letos jsme nebyli schopni uspokojit zvýšenou poptávku po melounech. Novinkou je také druhá odrůda okurky nakladačky a snacková sladká paprika ve dvou barevných variantách.

Roubovaná okurka nakladačka ANYA

Ke stávající jemnoostnné odrůdě Restina přidáváme hrubostnnou Anya, která se už osvědčila i v českých podmínkách. Je velmi úrodná, začíná plodit hned za prvním listem. Obě nakladačky jsou samozřejmě partenokarpické, takže se dají pěstovat kdekoli bez nutnosti opylení.



Roubovaná sladká snacková paprika PILLAR SWEET

Pro příští sezonu jsme nahradili odrůdu Sweet Snack Orange hned dvěma odrůdami snackových papriček - v sérii Pillar Sweet si můžete vybrat mezi červenými a žlutými plody. Pro pěknou barevnou kombinaci je samozřejmě nejlepší pěstovat obě vedle sebe.



Roubovaný meloun bezsemenný FASCINATION


Meloun Fascination bude hitem příští sezony. Vytváří velké plody oválného až hranatého tvaru o hmotnosti 6-9 kg, které jsou zcela bez semen. Pro úspěšné pěstování potřebujete vysadit poblíž i klasický vodní meloun (Edom Mountain nebo Ingrid), aby došlo k opylení květu a tvorbě plodu - stačí jeden klasický meloun až na tři bezsemenné.



Novinka pro sezonu 2026

Roubovaný meloun bez pecek

FASCINATION



Připravujeme propagační materiál i kampaň zacílenou na konečného spotřebitele

STATISTIKA PRODEJE TRVALEK

Česko bylo vždy zemí trvalekářů, jejich podíl na celkovém prodeji květin je větší než v jiných státech. Dnes už to samozřejmě nejsou jen skalničky, které si spotřebitelé vysazují na své předzahrádky, ale i větší trvalky na záhony anebo do velkých květináčů na terasy a balkony.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRODEJNÍ OBDOBÍ

Nejdůležitějším prodejním obdobím trvalek je jaro a začátek léta, dvě třetiny trvalek se hrnkují na jaře, aby vykvetly a prodaly se ve stejném roce. Asi jedna čtvrtina trvalek se pěstuje společně s dvouletkami pro prodej v březnu a dubnu. Kolem 7% trvalek (většinou ty okrasné listem) se prodá na podzim.

1. Jaro a začátek léta 67%
2. Předjaří 26%
3. Podzim 7%



1. Lavandula angustifolia
2. Saxifraga arendsii
3. Echinacea purpurea
4. Phlox subulata
5. Aubrieta hybrida
6. Salvia superba
7. Leucanthemum
8. Achillea millefolium
9. Pulsatilla vulgaris
10. Gaillardia aristata



NEJPRODÁVANĚJŠÍ DRUHY

Zdaleka nejprodávanejší trvalkou je levandule (prodá se jí třikrát více než druhé Saxifragy). Svůj podíl navyšují trvalky pěstované s dvouletkami (Saxifraga, Phlox subulata, Aubrieta, Pulsatilla). Z letně kvetoucích je kromě levandule velmi oblíbená Echinacea, Salvia, Leucanthemum, Achillea a Gaillardie.

1. Blue Scent
2. Aromatico
3. BeeZee
4. Hidcote
5. Vintro



NEJPRODÁVANĚJŠÍ LEVANDULE

Nejprodávanejší sérií levandule je semenáčová Blue Scent, dodávaná v různých velikostech sadby. Za ní následují řízkované Aromatico a BeeZee, která je velmi oblíbená jako polohotová přezimovaná. O něco méně se prodává klasická Hidcote a nová Vintro, která ji postupně nahrazuje (vhodná do výsadeb).

1. Touran Large White
2. Alpino Early Carnival
3. Touran Deep Red
4. Alpino Early Picotee
5. Alpino Deep Rose
6. Touran Deep Red
7. Touran Rose
8. Touran Limegreen
9. Alpino Early Lime
10. Alpino Early Rose





NEJPRODÁVANĚJŠÍ SAXIFRAGA

Zákazníci dávají přednost velkému květu a pěknému tvaru rostliny, proto objednávají hlavně řízkované odrůdy. Nejprodávanejší je Touran Large White s obřím bílým květem. Za ním následují syté a žíhané odstíny růžové a červené barvy. Oblíbené jsou i zelenkavé barvy květu Limegreen a Lime.




NEJOBLÍBENĚJŠÍ DODACÍ TÝDNY

Jarní špička hrnkování je mezi týdny 9 (do temperovaného skleníku) a 19, v tomto období se hrnkují trvalky určené k prodeji ve stejném roce. Trvalky pro přezimování se hrnkují od týdne 31 do týdne 43, největší dodací týden je 37 (Saxifragy, Aubriety, Phlox subulata atd.)



MALOOBCHODNÍ CENA LEVANDULE

Průměrná maloobchodní cena levandule v květináči K12 je 66,30 Kč (včetně DPH). Rozptyl cen u patnácti českých pěstitelů je obrovský, od 35 do 119 Kč, nejčastější cena je v rozmezí 55 až 80 Kč za rostlinu.



MALOOBCHODNÍ CENA ECHINACEA

Průměrná maloobchodní cena třapatky v květináči K17 je 121,30 Kč (včetně DPH). Rozptyl cen u patnácti českých pěstitelů je také obrovský, od 69 do 199 Kč, nejčastější cena je v rozmezí od 84 Kč do 154 Kč za rostlinu.

NOVINKY V MARKETINGU

Stále přemýšlíme, jak Vám ještě více pomoci s Vaším prodejem - kromě nových položek propagačního materiálu jsme proto vytvořili nový bonus program, díky kterému si můžete vybrat Vaše oblíbené květináče, banery nebo tiskoviny úplně zdarma.

BONUS PROGRAM 2026

Pro naše zákazníky jsme vytvořili úplně nový bonus program, díky kterému si mohou jednoduše objednat náš propagační materiál zdarma. Náš zákazník může uplatnit bonus 25 Kč za každý sadbovač, balení kořenů nebo plato polohotových rostlin objednaných na dodání v aktuálním roce.

Akce se vztahuje na veškerý propagační materiál s výjimkou etiket, držáků na packy a infocedulí - ty si můžete objednat samostatně v návaznosti na objednávku sadby.

Bonus může zákazník uplatnit od momentu potvrzení objednávky až do konce kalendářního roku dodání sadby. V případě nevyčerpání bonusu v roce dodání objednané sadby se bonus nepřevádí do dalšího roku. Pro více informací prosím kontaktujte našeho zástupce nebo se podívejte na www.plantana.cz, kde najdete i objednávkový formulář.



ETIKETA VELKÝ PŘEVIS

Reagovali jsme na požadavek našeho zákazníka a vytvořili jsme novou všeobecnou střední etiketu k označení všech rostlin, které vytváří převis. Mnoho spotřebitelů se zajímá o převislé typy rostlin a neví si rady, které rostliny si vybrat, protože v prodejním stavu často vypadají podobně jako ty vzpřímené. Označením těchto rostlin se zmenší počet dotazů na prodejní personál a zvýší hodnota průměrného nákupu.

Střední etiketa o velikosti 6x10 cm je dodávána na zapichovači o délce 21 cm. Dodáváme je ve svazcích po 25 kusech.

DRŽÁKY NA BYLINKY V PACKU I KVĚTINÁČI

Někteří zákazníci by rádi prodávali bylinky v deseti nebo šestipacích, roztríděných podle druhu použití. Pro ně jsme vytvořili držáky na packy, které spotřebitele informují, ke kterému účelu se vybrané druhy bylinek hodí. Tyto držáky můžete samozřejmě použít i na plata se čtyřmi květináči. Stejné dělení bylinek do skupin používáme i na etiketách, infocedulích, trio letáčích nebo na spotřebitelském webu www.bylinkyakoreni.cz.

Držáky na packy velikosti 32x2 cm dodáváme ve svazcích po 100 kusech.



Novinka pro naše zákazníky

BONUS PROGRAM



Za každý objednaný sadbovač dostanete bonus 25 Kč na objednávku našeho propagačního materiálu



PĚSTOVÁNÍ CHRYZANTÉM

Chryzantémy jsou nejoblíbenější květinou na podzimní prodej, který většinou začíná už od srpna a pokračuje až do začátku listopadu. Proto je důležité nabídnout kvalitní odrůdy ve všech ranostech, tak jako je nabízí náš dodavatel Royal van Zanten. V našem průzkumu spokojenosti zákazníků se rostliny tohoto dodavatele umístily na prvním místě v kvalitě sadby. Pro úspěšné dopěstování mladých rostlin je potřeba dodržovat následující pravidla.

HRNKOVÁNÍ

Zakořenělé řízky je potřeba hned po dodávce nahrnovat do vlhkého pěstebního substrátu (v opačném případě dochází ke zpomalení počátečního růstu). Hrnkujeme dostatečně hluboko, čímž umožníme lepší prokořenění i přikořenění bočních větví a následně lepší stabilitu rostliny v květináči.

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

Ideální jsou lehké a dobře propustné substráty, pH substrátu by se mělo pohybovat mezi 5,8 a 6,2. Substrát by měl mít následující složení: 50% hnědé rašeliny, 35% bílé rašeliny, 15% jílů, perlitu, případně kokosových vláken.

KONTEJNERY

Pro podzimní prodej klasických rostlin jsou využívány květináče o velikosti 15 cm až 5 litrů. Speciální odrůdy můžete ale pěstovat i v malém květináči a packu (Pax) nebo třeba v závěsném květináči (Skyfall). Pro docílení pěkného kulovitého tvaru rostliny je velmi důležitý dostatečný spon mezi rostlinami. Pokud se rostliny dotýkají, nikdy nemohou vytvořit pěkný tvar.

VÝŽIVA

Výživa chryzantém je klíčem k úspěchu. Je možné využít různé způsoby hnojení, nejjednodušší je s každou zálivkou přidávat

NPK v závislosti na substrátu a počasí. Mnoho úspěšných pěstitelů používá konkrétní plán hnojení, který Vám můžeme v rámci našeho servisu spočítat na základě rozboru vody.

Reakční doba a růst rostliny závisí na způsobu pěstování (příklad pro tradiční způsob):

- Po nahrnování začněte okamžitě přihnojovat NPK s vysokou dávkou dusíku (300 až 400 ppm). Pokračujte až do dosažení 40% až 50% cílového objemu rostliny (4-5 týdnů, při zatemňování 3 týdnů)
- Poté snižte koncentraci dusíku (na 200 až 250 ppm, NPK 20-10-20), to dotvoří dalších 20% až 25% objemu rostliny (na dobu dalších 3 týdnů, při zatemňování 2 týdnů)
- Po dosažení 60% až 75% konečné velikosti rostliny opět snižte koncentraci dusíku (na 50 až 100 ppm, NPK 15-10-30) k udržení barvy listů a převedení rostliny do generativní fáze. Tím také předejdete nadměrnému růstu či opožděnému kvetení.

ZÁVLAHA

Správná zálivka je rozhodující pro dopěstování kvalitních chryzantém. Rostliny by nikdy neměly vadnout v raných fázích růstu - vadnutí může omezit větvení a celkový růst rostlin. Mírné vadnutí může být prospěšné v pozdějších fázích při kontrole velikosti a jednotnějšího kvetení. Ideální je kapková zálaha, zejména jako prevence proti chorobám (např. padlí) v kombinaci s rozprašovačem (např. ráno 6:00 – 6:10 – rozprašovač, 8:00 – kapková zálaha). Nezalévejte po 11 hodině dopolední.

Během extrémně horkého období není vhodné zvyšovat objem zálivky, vede to ke kořenovým ztrátám a chloróze. Pokud zaléváte dvakrát denně, je dobré zalévat jednou čistou vodou a podruhé s hnojivem.

ZAŠTIPOVÁNÍ

Ve většině případů už chryzantémy nevyžadují zaštipování k docílení krásných kulatých rostlin. Rostliny pěstované při nízké vlhkosti prostředí můžeme ale zaštipnout.

Rostliny zaštipujeme, když vyrostou o 3 – 5 cm. To je obvykle 10 – 14 dnů po nahrnování. Poslední zaštipnutí by mělo být v polovině července, u dnešních odrůd není důvod zaštipovat víckrát.

REGULÁTORY RŮSTU

Některé odrůdy mají tendenci být příliš velké, proto je na ně potřeba použít růstové regulátory. Efektivní využití všech regulátorů růstu je více umění než věda.

Venkovní kultura

Pouze při použití hnojiva s vysokým obsahem dusíku, ošetření 2-3 krát během pěstební doby.

Skleníková kultura

Začněte 10 dní po nahrnování (lepší větvení), opakujte každý týden, nebo dle potřeby a klimatu.

Kvalitnějších rostlin většinou dosáhneme venku než ve skleníku, teplota a vlhkost vzduchu jsou ve skleníku příliš vysoké. Venkovní chryzantémy jsou většinou tužší, kompaktnější a celkově lepší pro konečného zákazníka. Velmi teplé letní noci mohou opozdit kvetení.

ZATEMŇOVÁNÍ

Téměř u žádného jiného druhu rostlin není tak výrazná fotoperiodická reakce jako u chryzantém. Proto jsou tyto rostliny ideální pro řízené pěstování. Většina odrůd chryzantém reaguje na délku dne jako rostliny krátkodenní. Tyto rostliny tedy zakládají a vyvíjejí květy pouze v krátkých dnech. U většiny odrůd jsou květy zakládány při 10 a více hodinách nepřetržité tmy - normálně jsou tyto podmínky splněny koncem léta a na podzim. Podle reakční doby jednotlivé variety přirozeně vykvétají mezi 34. a 43. týdnem.

Řízeným zatemňováním umožníme chryzantémám vykvést před přirozeným obdobím v konkrétním termínu. Zatemňování je možné u všech velikostí, od packů až po nejčastější K19. Krátký den vytvoříme zatemňováním po dobu 10-12 hodin denně. Tyto podmínky udržujeme až do začátku vybarvování pupat. Řízeným zatemňováním si můžete celý pěstební program efektivněji rozvrhnout, lépe využít pěstební místo a přizpůsobit kulturu pro její vyšší profitabilitu.



CHOROBY A ŠKŮDCI CHRYZANTÉM

Pro napěstování pěkných rostlin je samozřejmě důležitý i jejich dobrý zdravotní stav. Připravili jsme pro Vás přehled těch nejdůležitějších chorob a škůdců, které se u nás vyskytují a také doporučenou ochranu, vycházející z našich zkušeností (přípravky vždy nejdříve otestujte na menším počtu rostlin). Pro více informací prosím kontaktujte našeho zástupce.

HÁLKOVITOST (AGROBACTERIUM)

Popis: Do rostliny se dostává z infikované půdy, vody nebo z infikovaných řízků.

Symptomy: Slabé kořenění, hálky na kořenech stoncích i listech.

Prevence: Použití čisté, neinfikované vody, nezalévat podmokem. Použití zdravého pěstebního substrátu (redukce kompostů → při použití dezinfekce substrátu methylbromidem). Použití zdravé sadby.



BAKTERIÁLNÍ MĚKKÁ HNILOBA (ERWINIA)

Popis: Patogen zasahuje cévní svazky rostlin a následně způsobuje měkké hnití pleti a vadnutí.

Symptomy: Žloutnutí pletiva s následnou rychlou měkkou hnilobou listů a stonku. Někdy sukulentní růst vrcholu s následným nekrotickým zaschnutím.

Prevence: Hygienická opatření jako u hálkovitosti, likvidace napadených rostlin.



BÍLÁ REZ CHRYZANTÉM

Popis: Projevuje se ve stinném, vlhčím prostředí (podzimní choroba). Houba tvoří dva druhy spór, během zvýšené vlhkosti 96-100% po dobu 3 hodin teliospóry produkují basidiospóry, které snadno a rychle zasahují celou produkci. Basidiospóry se šíří rozstřikováním kapek vody a potřebují souvislý vodní film na povrchu pro infekci rostliny. Inkubační doba je závislá na teplotě a vlhkosti - min 2 hod při teplotě 17°C. Větrém se rozšiřující spóry přichází z plevelných rostlin, je nutná jejich pravidelná likvidace.

Symptomy: Bílá rez může být rozpoznána podle bílých nebo nažloutlých skvrn na horní straně listu - tyto jsou trochu ponořené a více jak 4 mm velké, časem hnědnou. Plodnice na spodní straně listu, jsou okrově až růžově zbarveny, časem až bílé. Tvoří se nejčastěji na mladých listech, během teplého a suchého období se symptomy nemusí projevit.

Prevence: Likvidace napadených rostlin, odstraňování plevelných chryzantemovitých rostlin

Ochrana: Aplikace fungicidů obsahujících účinnou látku ze skupiny triazolů či strobilurinů. DAGONIS (Difenokonazol, Fluxapyroxad); AMISTAR, ORTIVA, SCORE (Azoxystrobin); ZATO 50 WG (Trifloxystrobin).



VADNUTÍ A HNILOBA STONKU

Popis: Půdní houby, pronikající do cévního systému rostliny.

Symptomy: Zvadnutí celé rostliny (často však jen její části), žloutnutí listů, černá nekróza stonku. Příznaky se mohou projevit až u větších rostlin. Na průřezu stonkem – světle hnědé až červené zbarvení cévního svazku.

Ochrana: TOPSIN M 70 WP, ORTIVA, AMISTAR (Azoxystrobin), ALLIETE 80 WP (Fosetyl AL), CAPTAN 80 WP, MERPAN 80 WP (Kaptan).



PADLÍ

Popis: Patogen se šíří vzduchem prostřednictvím konidií, které za ideálních podmínek během několika hodin klíčí a zachycují se na povrchu listu. Následně se tvoří haustoria, která odebírají potřebné živiny. Optimálními podmínkami pro výskyt a šíření jsou střídavá vlhkost vzduchu (spíše sušší) a vyšší teploty (20 až 25 °C).

Symptomy: na listových čepelích (převážně na lící straně) vznikají bílé moučnaté skvrny, které se postupně zvětšují, až vytvářejí souvislé povlaky. Napadené části pomaleji rostou, žloutnou a usychají

Ochrana: ORTIVA (Azoxystrobin); ORONDIS EVO (Azoxystrobin, Oxathiapiprolin); LUNA SENSATION (Fluopyram, Trifloxystrobin); KUMULUS WG (Síra); DAGONIS (Difenokonazol, Fluxapyroxad); KUMULUS WG (Síra); TALENT (Myklobutanil); ZATO 50 WG (Trifloxystrobin).



LISTOVÉ SKVRNITOSTI A ČERNÁ SPÁLA

Popis: Šíření skvrnitostí podporuje vysoká relativní vlhkost vzduchu (přes 80 %) a teplota kolem 20–25°C. Na větší vzdálenosti se patogen šíří semeny nebo latentně infikovanými sazenicemi.

Symptomy: Žluté až hnědavé skvrny, u Cercosporu ohraničené - později hlavně na okraji tmavnoucí, nekrotizující. Didymella způsobuje léze na lodyhách. Na květech se zpočátku vyvinou skvrny, následně se infekce rychle šíří a může způsobit úplnou hnilobu květenství s květy slepenými k sobě. Houba dále proniká do květní stopky, způsobuje oslabení a černání pletiv a podporuje uvadání květenství

Ochrana: AMISTAR, ORTIVA, SCORE 250 EC (Azoxystrobin), TALENT (Myklobutanil), CAPTAN 80 WG, MERPAN 80 WG (Kaptan), DELAN 700 WDC (Dithianon), Zato 50 WG (Trifloxystrobin).



VIROVÁ ZAKRSLOST CHRYZANTEM

Popis: Velmi infekční, přenáší se pylem a infikovaným nářadím při manipulaci s rostlinami

Symptomy: mohou být různé a jsou závislé jak na odrůdě, tak i na pěstebních podmínkách, zvláště na teplotě a světelné intenzitě. Nejčastěji je to zakrslost rostliny a květů, nebo blednutí květů

Prevence: Použití pouze testovaného rostlinného materiálu. Plevel jako jsou Agryranthemum, Ageratum a jiné Asteraceae mohou mít příznaky infekce, proto je pravidelně odstraňujte.



VIROVÁ NEKRÓZA STONKŮ CHRYZANTÉMY

Popis: Je přenášena a rozšiřována třásněnkami Frankliniella occidentalis a Frankliniella schultzei (Thrips tabaci nepřenáší)

Symptomy: Typickým příznakem jsou nekrózy stonku. Nekrózy se šíří, zasahují listy, květní stopky a způsobují vadnutí listů a částí rostlin. Na listech se mohou objevit chlorotické a nekrotické tečky, difúzně žlutě ohraničené skvrny, případně kroužky. Intenzita příznaků může záviset na odrůdě.

Prevence: Likvidace rostlin po objevení v porostu. Ochrana proti přenašečům – třásněnkám.




MINOVAČI LISTŮ - VRTALKY

Popis: Poškození způsobují druhy Liriomyza huidobrensis, L. trifolii a Nemorimyza maculosa - dospělci jsou přibližně 2 mm dlouzí.

Symptomy: Dospělci způsobují bílé skvrny na mladých listech, larvy škodí minováním listů. Rozšiřují se aktivně létáním (při nižší teplotě kolem 10°C) nebo kontaminovaným materiálem.

Prevence: Zamezení vniknutí pomocí insekticidních sítí (0.6 x 0.8 mm). Monitorování pomocí žlutých lepových desek a preventivní postřik (vejččka a kukly nejsou citlivé na chemickou ochranu). Odstranění napadených rostlin a plevelů.

Ochrana: Ochrana proti housenkám je založena na aplikaci přípravků na bázi účinných látek VOLIAM TARGO; CORAGEN 20 SC (abamectin, chlorantraniliprole); indoxacarb; SPINTOR (spinosad); teflubenzuron a thiacloprid a proti dospělcům na bázi účinných látek MOSPILAN 20 SP, CAREO (acetamiprid); BELEM 0,8 MG, VAZTAK ACTIVE (cypermethrin); DECIS FORTE, SIVANTO ENERGY (deltamethrin); imidacloprid a teflubenzuron. Biologická ochrana: Miglyphus, Minex, Minusa.



TŘÁSNĚNKY

Popis: Poškozují rostliny sáním na vzrostných vrcholech, květech a listech. Významní přenašeči virů.

Symptomy: Posátí rostlinných pletí - stříbrné až bílé skvrny, které následně zhnědnou. Přítomnost černých výkalů, deformace květů, pupenů, listů a růstových vrcholů. Předčasné odumírání květů. hSignalizace: pomocí modrých a žlutých lepových desek.

Ochrana: APIS 200 SE, BENEVIA, DELMETROS 100 SC, KORON 100 SC, SPINTOR, VERTIMEC 1.8 EC. Mezi přirozené nepřátele patří draví roztoči čeledi Phytoseidae, např. Amblyseius swirskii a Neoseiulus cucumeris, dále pavouci a dravé plošnice Orius insidiosus.



SVILUŠKA CHMELOVÁ

Popis: Dospělci a larvy se vyskytují především na spodní straně listů, kde napichují pletiva listů a sáním způsobují nekrotická poškození.

Symptomy: Posátí rostlinných pletí - bíložluté skvrny, které následně zhnědnou, při silném výskytu je spodní strana listu potažena jemnou pavučinou. Často napadá květní pupen, který se následně nevyvíjí, deformuje a zčerná.

Ochrana: : ERADICOAT MAX, FLORAMITE 240 SC, KANEMITE 15 SC, MILBEKNOCK, NISSORUN 10 WP, NISSORUN 25 SC, ORTUS 5 SC, SHIRUDO, VERTIMEC 1.8 EC, VOLIAM TARGO. Biologická ochrana: TYPHLODROMUS PYRI (dravý roztoč), Svilaška ovocná - SPIDEX (Phytoseiulus persimilis).



MŠICE

Popis: Mšice se shromažďují v oblasti růstového vrcholu, poškozují rostliny sáním. Mohou přenášet virózy.

Symptomy: Listy se svažují a zvlní, až nakonec zežloutnou. Mšice postupně napadají i stonky, mladé výhonky, květy, které deformují. Na výměšcích mšic, tzv. medovicí, se uchycují saprofytické černě. Signalizace: pomocí žlutých lepových desek

Ochrana: KARATE ZEON 5 CS, DURSABAN 480 EC, jejich výskyt snižují například i přírodní KARANIMBA MIKRO, ROCK EFFECT, NEEMAZAAL TS. Biologická ochrana: Aphidamia, Aphidius colemani, Biolaagens AA, Biolaagens ACo.

FOTOGRAFIE OD NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Naši zástupci Vás navštěvují každý den, aby Vám poradili nejen s výběrem vhodných odrůd, ale i s pěstováním a prodejem. Během svých návštěv pořizují fotografie, které by mohly inspirovat i ostatní pěstitele. Zde přinášíme výběr těch nejzajímavějších z minulého období.



perfektně uniformní série
aster Showmakers



bohatá úroda Orangeliny
v květináči na balkoně



heuchera z letošních
kořenů



loňská úroda melounu Edom
Mountain na Plzeňsku




Calliope Landscape
v potištěném květináči



obří plody rybízu
Black Marle



Calliope Landscape
ve výsadbě



nové nízké a bohatě kvetoucí
slunečnice Sunfinity

Je nejvyšší čas objednat tyto rostliny:



Primule a macešky
na jarní prodej



Muškáty
na jaro 2026



Polohotové mandevilly
na jaro 2026



Letničky
na jaro 2026



Zeleninu
na jaro 2026



Bylinky na podzimní
i jarní hrnkování

Pro více informací kontaktujte naše zástupce



Tomáš Kulháněk
Manažer prodeje
tel: 724 341 315



Ladka Rubínová
Východní a Střední Čechy
tel: 724 549 309



Štěpán Zima
Západní, Jižní a Sev. Čechy
tel: 725 338 279



Jana Schubertová
Morava a Vysočina
tel: 793 912 626

www.plantana.cz